レジメンコード023006
レジメン名称　CBDCA/ABI/KEY(ｱﾛｶﾘｽ)
投与間隔　21 日
備考　AUC　6

病日　1　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」 アロカリス点滴静注235mg［10mL/B］ 後）デキサート注射液6.6mg［2mL/B］ ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） テルモ生食[100mL/袋] キイトルーダ点滴静注100ｍｇ［4mL/V］ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 ｍＬ 200 ｍｇ	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ ③の生食以降、フィルターなしのルートを使用 ◆◆アブラキサンはフィルター禁止のため◆◆ 点滴時間 5分	50 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5分	50 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） 大塚生食注[250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg{NK」［15mL/B］ ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 ｍＬ 0 ｍｇ/A	

レジメンコード 023006
レジメン名称 CBDCA/ABI/KEY(ｱﾛｶﾘｽ)
投与間隔 21 日
備考 AUC 6

病日 1 日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 15分 － 以下余白 －	50 ｍＬ	

レジメンコード023006
レジメン名称　CBDCA/ABI/KEY(ｱﾛｶﾘｽ)
投与間隔　21 日
備考　AUC　6

病日　8　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分 －　以下余白　－	50 ｍＬ	

レジメンコード023006
レジメン名称　CBDCA/ABI/KEY(ｱﾛｶﾘｽ)
投与間隔　21 日
備考　AUC　6

病日　15　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分 －　以下余白　－	50 ｍＬ	