

レジメンコード 023017

レジメン名称 Dur-Tre/CBDCA/PEM (1～4コース目) (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 CBDCA：AUC6

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] イジユド点滴静注25mg [1. 25mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 75 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イミフィンジ点滴静注500mg [10mL/瓶] 最大量超過認識済み(体重) 体重30kg以下の場合20mg/kg 最終濃度1～15mg/mL ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 1500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL 「タレウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6. 6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1. 5 瓶	

レジメンコード 023017

レジメン名称 Dur-Tre/CBDCA/PEM (1～4コース目) (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 CBDCA : AUC6

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ペメトレキセド点滴静注液800mg 「NK」 [32mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分	100 m L 500 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	