

レジメンコード 023019

レジメン名称 Dur-Tre/PEM (6コース目)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] イジユド点滴静注25mg [1. 25mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 75 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イミフィンジ点滴静注500mg [10mL/瓶] 最大量超過認識済み(体重) 体重30kg以下の場合20mg/kg 最終濃度1~15mg/mL ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 1500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0. 75mg/50mL 「タ体ウ」 デキサート注射液6. 6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	

レジメンコード023019
レジメン名称 Dur-Tre/PEM (6コース目)
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」[32mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分	100 m L 500 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	