

レジメンコード 023020

レジメン名称 Dur-Tre/CBDCA/ABI (1～4コース目) (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 CBDCA : AUC6

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] イジユド点滴静注25mg [1.25mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 75 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イミフィンジ点滴静注500mg [10mL/瓶] 最大量超過認識済み(体重) 体重30kg以下の場合20mg/kg 最終濃度1～15mg/mL ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 1500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ⑤の生食以降、フィルターなしのルートを使用 ◆◆アブラキサンはフィルター禁止のため◆◆ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	

レジメンコード 023020

レジメン名称 Dur-Tre/CBDCA/ABI (1～4コース目) (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 CBDCA：AUC6

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード023020
レジメン名称 Dur-Tre/CBDCA/ABI（1～4コース目）（アロカリス）
投与間隔 21 日
備考 CBDCA：AUC6

病日 8 日目 ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード023020
レジメン名称 Dur-Tre/CBDCA/ABI（1～4コース目）（アロカリス）
投与間隔 21 日
備考 CBDCA：AUC6

病日 15 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	