

レジメンコード 023023

レジメン名称 Nivo/CBDCA/PEM(アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 AUC：6、術前化学療法（最大3コース）

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] オプジーボ点滴静注120mg [12mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 360 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」[32mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	100 m L 500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」[15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	