

レジメンコード 024013

レジメン名称 CBDCA/VP-16/イミフィンジ (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 AUC 6、体重30kg以下はイミフィンジ20mg/kg

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] イミフィンジ点滴静注500mg [10mL/瓶] 最大量超過認識済み(体重) ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 2回目以降、10分まで短縮可 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	

レジメンコード 024013

レジメン名称 CBDCA/VP-16/イミフィンジ (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 AUC 6、体重30kg以下はイミフィンジ20mg/kg

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード024013

レジメン名称 CBDCA/VP-16/イミフィンジ (アカリス)

投与間隔 21 日

備考 AUC 6、体重30kg以下はイミフィンジ20mg/kg

病日 2 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 024013

レジメン名称 CBDCA/VP-16/イミフィンジ (アカリス)

投与間隔 21 日

備考 AUC 6、体重30kg以下はイミフィンジ20mg/kg

病日 3 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L	
— 以下余白 —		