

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 3 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 4 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 5 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 6 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	

レジメンコード 010028

レジメン名称 AZA+VEN

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 7 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ビダーザ注射用100mg ○化学療法で実施 ① 1Vにつき注射用水4mLで溶解する VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目以降400mg （VEN：CYP3A阻害剤併用時用量調節） — 以下余白 —	20 m L 75 m g / m²	