

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 1 日目

ページ数：1/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アセリオ静注液1000mgバッグ [100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] マイロターゲット点滴静注用5mg 1バイアルを注射用水5mLで溶解 (1mg/mL) 調製および投与時【遮光】 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	100 m L 3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 2 日目

ページ数：2/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ⑤ ①開始12時間後に投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 2 日目

ページ数：3/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 3 日目

ページ数：4/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ⑤ ①開始12時間後に投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 3 日目

ページ数：5/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 4 日目

ページ数：6/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 mL 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 mL 2000 mg / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ⑤ ①開始12時間後に投与 点滴時間 30分	50 mL 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 mL 2000 mg / m ²	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 4 日目

ページ数：7/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 5 日目

ページ数：8/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラピン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラピン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 010029

レジメン名称 GO-HiDAC療法

投与間隔 28 日

備考 60歳以上はAra-C：1.5 g / m²1日2回に減量

病日 6 日目

ページ数：9/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラピン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラピン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		