レジメンコード 011014

レジメン名称 APL219R 地固め療法G0

投与間隔 28 日

備考 2回投与（day15で末梢血が回復していない場合day29まで経過観察、血球回復得られない場合2回目行わない）

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） アセリオ静注液1000mgバッグ[100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] マイロターゲット点滴静注用5mg 1バイアルを注射用水5mLで溶解（1mg/mL） 調製および投与時【遮光】 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	100 m L 3 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 011014

レジメン名称 APL219R 地固め療法G0

投与間隔 28 日

備考 2回投与（day15で末梢血が回復していない場合day29まで経過観察、血球回復得られない場合2回目行わない）

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） アセリオ静注液1000mgバッグ[100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] マイロターゲット点滴静注用5mg 1バイアルを注射用水5mLで溶解（1mg/mL） 調製および投与時【遮光】 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	100 m L 3 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	