

レジメンコード 012019  
 レジメン名称 Ph+ALL208IMA地固め療法C1  
 投与間隔 28 日  
 備考 15歳以上59歳以下

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] メソトレキセート点滴静注液200mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 23時間	500 m L 900 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与 点滴時間 30分  - 以下余白 -	1 袋	

レジメンコード 012019  
 レジメン名称 Ph+ALL208IMA地固め療法C1  
 投与間隔 28 日  
 備考 15歳以上59歳以下

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 012019  
レジメン名称 Ph+ALL208IMA地固め療法C1  
投与間隔 28 日  
備考 15歳以上59歳以下

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012019  
 レジメン名称 Ph+ALL208IMA地固め療法C1  
 投与間隔 28 日  
 備考 15歳以上59歳以下

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 前日④開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012019  
 レジメン名称 Ph+ALL208IMA地固め療法C1  
 投与間隔 28 日  
 備考 15歳以上59歳以下

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ ②開始12時間後に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用40mg ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	100 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード 012019  
 レジメン名称 Ph+ALL208IMA地固め療法C1  
 投与間隔 28 日  
 備考 15歳以上59歳以下

病日 4 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ MTX投与開始36時間後から6時間毎に投与 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L 15 m g	