

レジメンコード 012034

レジメン名称 JALSG Ph+ALL219地固め療法C2

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m<sup>2</sup>/日 day1-7漸減、DA or PN day2-22

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 1200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 45 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	