

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21) 、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管) ②終了後投与開始 点滴時間 5分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) ③終了後フラッシュ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/袋] メソトレキセート点滴静注液1000mg[40mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ①終了後、投与開始 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 3000 m g / m ²	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21)、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① MTX終了後フラッシュ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21) 、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX開始36時間後に投与開始 (初回50mg/body) 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g / m ²	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21) 、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 4 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g / m ²	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21) 、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 15 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管) ②終了後投与開始 点滴時間 5分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管) ③終了後フラッシュ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/袋] メソトレキセート点滴静注液1000mg[40mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ①終了後、投与開始 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 3000 m g / m ²	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21)、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 16 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① MTX終了後フラッシュ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21) 、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 17 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① MTX開始36時間後に投与開始 (初回50mg/body) 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 50 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g / m ²	

レジメンコード 012037

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C2

投与間隔 28 日

備考 6MP 25mg/m² (day1-21) 、MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 18 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g / m ²	