

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 1 日目

ページ数：1/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 8 日目

ページ数：2/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 15 日目

ページ数：3/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 29 日目

ページ数：4/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	250 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX：10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP：60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 30 日目

ページ数：5/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX：10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP：60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 31 日目

ページ数：6/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 32 日目

ページ数：7/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX：10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP：60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 33 日目

ページ数：8/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX：10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP：60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 36 日目

ページ数：9/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 37 日目

ページ数：10/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX：10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP：60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 38 日目

ページ数：11/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX : 10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP : 60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 39 日目

ページ数：12/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012038

レジメン名称 JALSG ALL202-0 C3

投与間隔 49 日

備考 DEX：10mg/m² day1-8, 15-22、6-MP：60mg/m² day29-42、day36以降は好中球0時点で中止

病日 40 日目

ページ数：13/13

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	