

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 1200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039
 レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入
 投与間隔 28 日
 備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 2 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012039
 レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入
 投与間隔 28 日
 備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 3 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039
 レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入
 投与間隔 28 日
 備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 8 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 9 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 11 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039
 レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入
 投与間隔 28 日
 備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 13 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 15 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 16 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 18 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039

レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入

投与間隔 28 日

備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 20 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 3000 単位/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 012039
 レジメン名称 JALSG ALL202-0 寛解導入
 投与間隔 28 日
 備考 PSL：60mg/m²/日 day1-21

病日 22 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1.3 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		