

レジメンコード012041

レジメン名称JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 3week（day15～）

投与間隔7 日

備考DEX 休薬（day15-21）（10-39歳） or DEX 5→2.5→1.25mg/m²（day15-20）（40-64歳）

病日1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	50 m L	
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「フー」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ⑤ L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 m L 5000 単位 / m ²	

レジメンコード012041
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 3week（day15～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 休薬（day15-21）（10-39歳） or DEX 5→2.5→1.25mg/m²（day15-20）（40-64歳）

病日 4 日目 ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 m L 5000 単位/m ²	

レジメンコード012041
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 3week（day15～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 休薬（day15-21）（10-39歳） or DEX 5→2.5→1.25mg/m²（day15-20）（40-64歳）

病日 7 日目 ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM）[外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 mL 5000 単位/m ²	