

レジメンコード012043
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 5week（day29～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 5→2.5→1.25mg/m²（day29-37）（10-39歳） or DEX 休薬（40-64歳）

病日 1 日目 ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012043
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 5week（day29～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 5→2.5→1.25mg/m²（day29-37）（10-39歳） or DEX 休薬（40-64歳）

病日 2 日目 ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM）[外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 mL 5000 単位/m ²	

レジメンコード012043
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 5week（day29～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 5→2.5→1.25mg/m²（day29-37）（10-39歳） or DEX 休薬（40-64歳）

病日 5 日目 ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM）[外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量	1 mL 5000 単位/m ²	
脳脊髄腔注射（腰椎） 注射用メソトレキセート50mg キロサイド注20mg [1mL/A] 水溶性プレドニン20mg 注射用水(大塚蒸留水)[20mL/A] ○化学療法で実施 ② MTXは注射用水20mLで溶解（2.5mg/mL）し、4.8mL使用 PSLは注射用水2mLで溶解（10mg/mL）し、1mL使用 — 以下余白 —	12 mg 30 mg 10 mg 2 管	