

レジメンコード012045
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 6week（day36～）
投与間隔 9 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 1 日目 ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体り」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012045
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 6week（day36～）
投与間隔 9 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 3 日目 ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「フソ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ④ L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 m L 5000 単位 / m ²	

レジメンコード012045
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 6week（day36～）
投与間隔 9 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 4 日目 ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012045
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 6week（day36～）
投与間隔 9 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 5 日目 ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012045
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 6week（day36～）
投与間隔 9 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 6 日目 ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「フソ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ④ L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 m L 5000 単位 / m ²	