

レジメンコード012046
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 7week（day45～）
投与間隔 7 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 1 日目 ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「フソ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ④ L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3000U/m ² /回に減量	1 m L 5000 単位 / m ²	
脳脊髄腔注射（腰椎） 注射用メソトレキセート50mg キロサイド注20mg [1mL/A] 水溶性プレドニン20mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ MTXは注射用水20mLで溶解（2.5mg/mL）し、4.8mL使用 PSLは注射用水2mLで溶解（10mg/mL）し、1mL使用 — 以下余白 —	12 m g 30 m g 10 m g 2 管	

レジメンコード012046
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 7week（day45～）
投与間隔 7 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 2 日目 ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012046
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 7week（day45～）
投与間隔 7 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 3 日目 ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012046
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 早期強化療法（IB） 7week（day45～）
投与間隔 7 日
備考 6-MP 60mg/m²（day36-63）（NUDT15遺伝子多型により投与量調整）

病日 4 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「フソ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ④ L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 m L 5000 単位 / m ²	