

レジメンコード012050
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (NEL)
投与間隔 7 日
備考

病日 1 日目 ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012050
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (NEL)
投与間隔 7 日
備考

病日 2 日目 ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012050
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (NEL)
投与間隔 7 日
備考

病日 3 日目 ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012050
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (NEL)
投与間隔 7 日
備考

病日 4 日目 ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012050
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (NEL)
投与間隔 7 日
備考

病日 5 日目 ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	650 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	