

レジメンコード012051

レジメン名称JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)

投与間隔21 日

備考DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
) or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② AraC：60-64歳 1,000mg/m ² に減量 【シタラビン12時間毎投与】 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ AraC：60-64歳 1,000mg/m ² に減量 【シタラビン12時間毎投与】 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード012051
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)
投与間隔 21 日
備考 DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日 2 日目 ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② AraC：60-64歳 1,000mg/m ² に減量 【シタラビン12時間毎投与】 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ AraC：60-64歳 1,000mg/m ² に減量 【シタラビン12時間毎投与】 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012051

レジメン名称JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)

投与間隔21 日

備考DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
) or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日3 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 【エトポシド12時間毎投与】 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012051

レジメン名称JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)

投与間隔21 日

備考DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日4 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ ^ッ グ ^グ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 【エトボシド12時間毎投与】 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ ^ッ グ ^グ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 【エトボシド12時間毎投与】 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012051

レジメン名称JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)

投与間隔21 日

備考DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日5 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ ^ッ グ ^グ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 【エトボシド12時間毎投与】 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ ^ッ グ ^グ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ①開始12時間後に投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 【エトボシド12時間毎投与】 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード012051
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)
投与間隔 21 日
備考 DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日 5 日目 ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
脳脊髄腔注射（腰椎） 注射用メソトレキセート50mg キロサイド注20mg [1mL/A] 水溶性プレドニン20mg 注射用水（大塚蒸留水）[20mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ MTXは注射用水20mLで溶解（2.5mg/mL）し、4.8mL使用 PSLは注射用水2mLで溶解（10mg/mL）し、1mL使用 — 以下余白 —	12 m g 30 m g 10 m g 2 管	

レジメンコード012051
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)
投与間隔 21 日
備考 DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日 6 日目 ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 1-24歳：25,000U/m ² 、40-64歳：7500U/m ² に減量 — 以下余白 —	1 管 15000 単位/m ²	

レジメンコード012051
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 強化療法 (HR3)
投与間隔 21 日
備考 DEX20mg/m² (day1-5) (1-39歳) or DEX10mg/m² (day1-5) (40-59歳)
or DEX10mg/m² (day1-3) (60-64歳)

病日 11 日目 ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 1-24歳：25,000U/m ² 、40-64歳：7500U/m ² に減量 — 以下余白 —	1 管 15000 単位/m ²	