

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 1 日目 ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 8.25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
脳脊髄腔注射（腰椎） 注射用メソトレキセート50mg キロサイド注20mg [1mL/A] 後）ヒドロコルチゾン酢酸エステルNa静注液100mg「AFP」 [2mL/A] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ MTXは注射用水20mLで溶解（2.5mg/mL）、4.8mL使用 － 以下余白 －	12 m g 30 m g 25 m g 1 管	

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 2 日目 ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 8.25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 3 日目 ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 8.25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 1200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 － 以下余白 －	50 m L	

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 4 日目 ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 8.25 m g /m ²	

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 5 日目 ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 8.25 m g /m ²	

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 6 日目 ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 8.25 m g /m ²	

レジメンコード012061
レジメン名称 JALSG ALL202-U 寛解導入2week (day8-14)
投与間隔 8 日
備考

病日 7 日目 ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L 8.25 m g /m ²	