

レジメンコード012062
レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入3week (day15-21)
投与間隔 7 日
備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 1 日目 ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「フソー」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ④ L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） － 以下余白 －	1 m L 6000 単位 / m ²	

レジメンコード012062
レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入3week (day15-21)
投与間隔 7 日
備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 3 日目 ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） — 以下余白 —	1 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード012062
レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入3week (day15-21)
投与間隔 7 日
備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 5 日目 ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） — 以下余白 —	1 m L 6000 単位/m ²	

レジメンコード012062
レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入3week (day15-21)
投与間隔 7 日
備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 7 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） — 以下余白 —	1 m L 6000 単位/m ²	