

レジメンコード 012063

レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入4week (day22-28)

投与間隔 7 日

備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコピン注射用1mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
脳脊髄腔注射 (腰椎) 注射用メソトレキセート50mg キロサイド注20mg [1mL/A] 後) ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg 「AFP」 [2mL/A] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ○化学療法で実施 ④ MTXは注射用水20mLで溶解 (2.5mg/mL) 、4.8mL使用 - 以下余白 -	12 m g 30 m g 25 m g 1 管	

レジメンコード 012063

レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入4week (day22-28)

投与間隔 7 日

備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用水「ワツ」 [5mL/A] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） — 以下余白 —	1 mL 6000 単位/m ²	

レジメンコード 012063

レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入4week (day22-28)

投与間隔 7 日

備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 4 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用水「ワツ」 [5mL/A] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） — 以下余白 —	1 mL 6000 単位/m ²	

レジメンコード 012063

レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入4week (day22-28)

投与間隔 7 日

備考 PSL40mg/m²po (day15-28) (day29以降10mg/m²3日間で中止)

病日 6 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用水「ワツ」 [5mL/A] ロイナーゼ注用5000 [5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL） — 以下余白 —	1 mL 6000 単位/m ²	