

レジメンコード012064  
レジメン名称 JALSG ALL202-U寛解導入5week (day29-35)  
投与間隔 7 日  
備考 PSL40mg/m<sup>2</sup>po (day15-28) (day29以降10mg/m<sup>2</sup>3日間で中止)

病日 1 日目 ページ数：1/1

| <薬品名・用法>                                                                                                                    | <用量>                               | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分                                                  | 1 袋                                |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>オンコビン注射用1mg<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 5分                                             | 50 m L<br>1.5 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分                                                           | 50 m L                             |      |
| 筋肉注射（I M） [外来]<br>注射用水「フソー」[5mL/A]<br>ロイナーゼ注用5000[5000単位/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>L-ASPは注射用水1mLで溶解（5000単位/mL）<br><br>－ 以下余白 － | 1 m L<br>6000 単位 / m <sup>2</sup>  |      |