

レジメンコード 012506
 レジメン名称 VEN+R (2～6コース目)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アセリオ静注液1000mgバッグ [100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] リツキサン点滴静注500mg [50mL/B] 最大量超過認識済み(体表) ○化学療法で実施 ④ = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～30分 100mL/hr 30～60分 200mL/hr 60～90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr	500 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	