レジメンコード014004
レジメン名称　R-CHOP療法（B cell lymphoma）
投与間隔　　14 日
備考　　PSL（内服）　50mg/㎡　day 3-7

病日　1　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後）ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 ｍＬ 1 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） アセリオ静注液1000mgバッグ[100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 ｍｇ	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 ｍＬ 1 管	
点滴注射（ＤＩＶ） 大塚生食注 [500mL/B] 後)ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注500mg「KHK」[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ ＝生食は1mg/mLとなるように変更する＝ ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分　50mL/hr 30～60分　100mL/hr 60～90分　150mL/hr 90～120分　200mL/hr 120～150分　250mL/hr 150～180分　300mL/hr 180～210分　350mL/hr 210分以降　400mL/hr ■投与法（2回目以降の投与、下記に該当する場合）■ 初回投与時の副作用が軽微、臨床的に重篤な心疾患なし 末梢血リンパ球数5000/μL未満の場合 ========== 最初の30分で投与量（液量）の20%を投与 その後60分で投与量（液量）の80%を投与	500 ｍＬ 375 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間　10分 －　以下余白　－	50 ｍＬ	

レジメンコード014004
レジメン名称　R-CHOP療法（B cell lymphoma）
投与間隔　14 日
備考　PSL（内服）　50mg/㎡　day 3-7

病日　3　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（ＤＩＶ） テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 ｍＬ 50 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間　5分	50 ｍＬ 1.4 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 ｍＬ 750 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間　10分 －　以下余白　－	50 ｍＬ	