

レジメンコード 014031

レジメン名称 EPOCH

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 60mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトキシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] オンコピン注射用1mg 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間  - 以下余白 -	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup> 0.4 m g / m <sup>2</sup> 10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 014031

レジメン名称 EPOCH

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 60mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① ルート交換用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] オンコビン注射用1mg 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup> 0.4 m g / m <sup>2</sup> 10 m g / m <sup>2</sup>	
- 以下余白 -		

レジメンコード 014031

レジメン名称 EPOCH

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 60mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① ルート交換用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] オンコビン注射用1mg 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間  — 以下余白 —	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup> 0.4 m g / m <sup>2</sup> 10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 014031

レジメン名称 EPOCH

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 60mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① ルート交換用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] オンコビン注射用1mg 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup> 0.4 m g / m <sup>2</sup> 10 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014031

レジメン名称 EPOCH

投与間隔 21 日

備考 PSL (内服) 60mg/m<sup>2</sup> day 1-5

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① ルート交換用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 750 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		