

レジメンコード 014033

レジメン名称 GDP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 8 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	300 m L	

レジメンコード 014033

レジメン名称 GDP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014033

レジメン名称 GDP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 3 瓶	

レジメンコード 014033

レジメン名称 GDP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 3 瓶	

レジメンコード 014033

レジメン名称 GDP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 3 瓶	

レジメンコード 014033

レジメン名称 GDP

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		