

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 1 日目

ページ数：1/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管） ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 側管） ②終了後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 1.3 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管） ③イホマイドと同時に投与開始 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）エトボシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管） ③終了後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 150 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管） ⑤終了後ルートフラッシュ用 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 1 日目

ページ数：2/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管） ③イホマイド開始4時間後に投与 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ①終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管） ③イホマイド開始8時間後に投与 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ ⑧終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑩終了後に投与開始 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 2 日目

ページ数：3/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 側管) ②終了後に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 750 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管) ③終了後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 1.3 g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) ④イホマイドと同時に投与開始 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ④終了後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 150 m g / m ²	

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 2 日目

ページ数：4/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ①終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑥終了後ルートフラッシュ用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ④イホマイド開始4時間後に投与 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管) ④イホマイド開始8時間後に投与 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑦終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ⑫ 側管) ③投与12時間後、③投与前に投与 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 2 日目

ページ数：5/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑬ 側管） ⑫投与終了後に投与 点滴時間 3時間	500 m L 750 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ ⑪終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑮ 側管） ⑬終了後ルートフラッシュ用 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 3 日目

ページ数：6/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後) シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 側管) ②終了後に投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 750 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管) ③終了後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 1.3 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管) ④イホマイドと同時に投与開始 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤終了後に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 150 m g / m ²	

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 3 日目

ページ数：7/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ①終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑥終了後ルートフラッシュ用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ④イホマイド開始4時間後に投与 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管) ④イホマイド開始8時間後に投与 点滴時間 15分	100 m L 260 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ ⑦終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) ヒトコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ⑫ 側管) ③投与12時間後、③投与前に投与 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 3 日目

ページ数：8/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑬ 側管） ⑫投与終了後に投与 点滴時間 3時間	500 m L 750 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ ⑪終了後に投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑮ 側管） ⑬終了後ルートフラッシュ用 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014047

レジメン名称 IDEA

投与間隔 21 日

備考 Ara-C投与開始～翌日までフルオロメトロン点眼0.1%1日4回

病日 4 日目

ページ数：9/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 5 瓶	