

レジメンコード014049
レジメン名称 Pola＋BR療法
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目 ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） アセリオ静注液1000mgバッグ[100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）リツキマブBS点滴静注500mg「KHK」[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ ＝生食は1mg/mLとなるように変更する＝ ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法（2回目以降の投与、下記に該当する場合）■■ 初回投与時の副作用が軽微、臨床的に重篤な心疾患なし 末梢血リンパ球数5000/ μ L未満の場合 =====	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
－ 以下余白 －		

レジメンコード 014049
 レジメン名称 Pola+BR療法
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） アセリオ静注液1000mgバッグ[100mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ポライビー点滴静注用30m g ■希釈後の最終濃度0.72～2.7mg/mL ■BW42kg以下、またはPola75.6mg以下の場合、生食50mL ○化学療法で実施 点滴時間 1時間30分 ④ 点滴時間は2回目以降、30分に短縮可能	100 m L 1.8 m g /kg	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL ■調製後6時間以内に投与終了■ ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L 90 m g /m ²	

レジメンコード014049
レジメン名称 Pola＋BR療法
投与間隔 21 日
備考

病日 2 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 － 以下余白 －	50 m L	

レジメンコード014049
レジメン名称 Pola＋BR療法
投与間隔 21 日
備考

病日 3 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 90 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	