

レジメンコード 014050

レジメン名称 M-CHOP療法

投与間隔 21 日

備考 MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 水溶性プレドニン20mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 60 m g	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] メソトレキセート点滴静注液1000mg [40mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 3500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg [NK] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014050

レジメン名称 M-CHOP療法

投与間隔 21 日

備考 MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 9時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 水溶性ブレドニン20mg ○化学療法で実施 ② ①終了後、投与 点滴時間 15分	50 m L 60 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 15時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 21時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 30 m g	

レジメンコード 014050

レジメン名称 M-CHOP療法

投与間隔 21 日

備考 MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 3時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 9時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 15時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 21時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 30 m g	

レジメンコード 014050

レジメン名称 M-CHOP療法

投与間隔 21 日

備考 MTX投与開始後24時間、48時間、72時間に血中濃度測定

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 3時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 9時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 15時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分	50 m L 30 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 21時に投与開始 6時間毎に投与 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 30 m g	