

レジメンコード 014054

レジメン名称 MEAM

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 10:30～11:00 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ② 11:00～12:30 点滴時間 1時間30分	250 m L 150 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ③ 12:30～14:00 点滴時間 1時間30分	250 m L 150 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 14:00～14:10 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 22:30～23:00 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 014054

レジメン名称 MEAM

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 10:30～11:00 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/袋] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 11:00～13:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/袋] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 13:00～15:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 15:00～15:10 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 22:30～23:00 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 014054

レジメン名称 MEAM

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 10:30～11:00 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後）エトキシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 11:00～13:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後）エトキシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 13:00～15:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 15:00～15:10 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 22:30～23:00 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 014054

レジメン名称 MEAM

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 10:30～11:00 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 11:00～13:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 13:00～15:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ④ 15:00～15:30	50 m L 2 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [250mL/袋] 後）シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ 15:30～18:30 点滴時間 3時間	250 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 18:30～18:40 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード014054
レジメン名称 MEAM
投与間隔 28 日
備考

病日 4 日目 ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 22：30～23：00 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 014054

レジメン名称 MEAM

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 10:30～11:00 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 11:00～13:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 13:00～15:00 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ④ 15:00～15:30	50 m L 2 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [250mL/袋] 後）シタラビン点滴静注液1g 「NIG」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ 15:30～18:30 点滴時間 3時間	250 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 18:30～18:40 点滴時間 10分	50 m L	

レジメンコード014054
レジメン名称 MEAM
投与間隔 28 日
備考

病日 5 日目 ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ⑦ 22：30～23：00 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード014054
レジメン名称 MEAM
投与間隔 28 日
備考

病日 6 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ① 10:30～11：00 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アルケラン静注用50mg ○化学療法で実施 ② 11：00～11：10 点滴時間 10分	100 m L 140 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 11：10～11：20 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ④ 22：30～23：00 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	