

レジメンコード 014055

レジメン名称 VR-CAP療法

投与間隔 21 日

備考 PSL（内服）100mg/body：day 1-5、6~8コース

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド（ボルテゾミブ）濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) トロロチザンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） アセリオ静注液1000mgバッグ [100mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	500 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分	50 m L 1 管	

レジメンコード 014055

レジメン名称 VR-CAP療法

投与間隔 21 日

備考 PSL（内服）100mg/body：day 1-5、6～8コース

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後)リツキマブ [®] BS点滴静注500mg「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■投与法（2回目以降の投与、下記に該当する場合）■ 初回投与時の副作用が軽微、臨床的に重篤な心疾患なし 末梢血リンパ球数5000/ μ L未満の場合 ===== 最初の30分で投与量（液量）の20%を投与 その後60分で投与量（液量）の80%を投与	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m ²	

レジメンコード 014055

レジメン名称 VR-CAP療法

投与間隔 21 日

備考 PSL（内服）100mg/body：day 1-5、6~8コース

病日 1 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014055

レジメン名称 VR-CAP療法

投与間隔 21 日

備考 PSL（内服）100mg/body：day 1-5、6~8コース

病日 4 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド（ボルテゾミブ）濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 014055

レジメン名称 VR-CAP療法

投与間隔 21 日

備考 PSL（内服）100mg/body：day 1-5、6~8コース

病日 8 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド（ボルテゾミブ）濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	

レジメンコード 014055

レジメン名称 VR-CAP療法

投与間隔 21 日

備考 PSL（内服）100mg/body：day 1-5、6~8コース

病日 11 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>皮下注射（SC） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のベルケイド（ボルテゾミブ）濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>1.3 mg/m² 5 mL</p>	