レジメン名称 Epcoritamab 1コース目

投与間隔 28 日

備考 day1.8.15.22の本剤投与後3日間(翌日、2日目、3日目)プルドニゾロン100

mg内服

病日 1 日目 ページ数:1/4

| 7/3 H I H H   |                  | - ン 数:1/4 |
|---|------------------|-----------|
| <薬品名・用法>  | <用量>             | <メモ><br>  |
| 皮下注射(SC) [外来] エプキンリ皮下注4mg[0.8mL/B] 生理食塩液(大塚生食注)[20mL/A] ①本剤0.8mLを生食4.2mLで希釈(0.8mg/mL) ②希釈溶液①2.0mLを生食8.0mLで希釈(0.16mg/mL) 上記希釈溶液②より1.0mLを投与 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 0.16 mg<br>1 管   |           |
| 一 以下余白 一  | 1<br>1<br>1<br>1 | <br>      |
|   |                  | <br>      |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   | <br>             | <br>      |
|   | 1<br>            | <br>      |
|   | <br>             |           |
|   |                  |           |
|   |                  |           |
|   | <br>             | <br>      |
|   | 1<br>            | <br>      |
|   | 1<br>            | <br>      |
|   | 1<br>1<br>1<br>1 | <br>      |
|   | 1<br>1<br>1<br>1 | <br>      |
|   | 1<br>            | <br>      |
|   | 1                | 1<br>1    |

レジメン名称 Epcoritamab 1コース目

投与間隔 28 日

備考 day1.8.15.22の本剤投与後3日間(翌日、2日目、3日目)プルドニゾロン100

mg内服

病日 8 日目 ページ数: 2/4

| 7円 O 日日  |               | - > 数:2/4   |
|--|---------------|-------------|
| <薬品名・用法>   | <用量>          | <メモ><br>    |
| 皮下注射 (SC) [外来] エプキンリ皮下注4mg [0.8mL/B] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ①本剤0.8mLを生食4.2mLで希釈 (0.8mg/mL) 上記希釈溶液①より1.0mLを投与 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 0.8 mg<br>1 管 |             |
| 一 以下余白 一   |               | <br>        |
|  |               | I<br>I<br>I |
|  |               | <br>        |
|  |               | <br>        |
|  |               |             |
|  |               | <br>        |
|  |               | <br>        |
|  |               | <br>        |
|  |               |             |
|  |               | <br>        |
|  |               | <br>        |
|  |               | <br>        |
|  |               |             |
|  |               |             |
|  |               |             |
|  |               |             |

レジメン名称 Epcoritamab 1コース目

投与間隔 28 日

備考 day1.8.15.22の本剤投与後3日間(翌日、2日目、3日目)プルドニゾロン100

mg内服

病日 15 日目 ページ数:3/4

| 内口 15 日日<br>   | 口 15 日日 |       |
|--|---------|-------|
| <薬品名・用法>   | <用量>    | <メモ>  |
| 皮下注射(SC) [外来]<br>エプキンリ皮下注48mg[0.8mL/B]<br>希釈せず0.8mLを投与<br>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 48 mg   |       |
| 一 以下余白 一   |         | <br>  |
|  |         | 1<br> |
|  |         |       |
|  |         | <br>  |
|  |         | <br>  |

レジメン名称 Epcoritamab 1コース目

投与間隔 28 日

備考 day1.8.15.22の本剤投与後3日間(翌日、2日目、3日目)プルドニゾロン100

mg内服

病日 22 日目 ページ数:4/4

| 竹口 ZZ 口日  |       | - 7 一 ク 叙: 4/ 4 |
|---|-------|-----------------|
| <薬品名・用法>  | <用量>  | <メモ>            |
| 皮下注射 (SC) [外来] エプキンリ皮下注48mg[0.8mL/B] 希釈せず0.8mLを投与 | 48 mg |                 |
| 一 以下余白 一  |       | <br>            |
|   |       |                 |
|   |       |                 |
|   |       |                 |
|   |       | <br>            |