

レジメンコード014056-2
レジメン名称 Epcoritamab 2～3コース目
投与間隔 28 日
備考 Grade2～3のCRS出現した場合、投与前および投与後3日目までプレニゾロ
ン100mg内服（G2以上CRSなくなるまで）

病日 1 日目 ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 エプキンリ皮下注48mg〔0.8mL/B〕 希釈せず0.8mLを投与 ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	48 m g	

レジメンコード014056-2
レジメン名称 Epcoritamab 2～3コース目
投与間隔 28 日
備考 Grade2～3のCRS出現した場合、投与前および投与後3日目までプレドニゾロ
ン100mg内服（G2以上CRSなくなるまで）

病日 8 日目 ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 エプキンリ皮下注48mg〔0.8mL/B〕 希釈せず0.8mLを投与 ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	48 m g	

レジメンコード014056-2
レジメン名称 Epcoritamab 2～3コース目
投与間隔 28 日
備考 Grade2～3のCRS出現した場合、投与前および投与後3日目までプレニジド
ン100mg内服（G2以上CRSなくなるまで）

病日 15 日目 ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）[外来] エプキンリ皮下注48mg[0.8mL/B] 希釈せず0.8mLを投与 ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	48 m g	

レジメンコード014056-2
レジメン名称 Epcoritamab 2～3コース目
投与間隔 28 日
備考 Grade2～3のCRS出現した場合、投与前および投与後3日目までプレニゾロ
ン100mg内服（G2以上CRSなくなるまで）

病日 22 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC）〔外来〕 エプキンリ皮下注48mg〔0.8mL/B〕 希釈せず0.8mLを投与 ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	48 m g	