

レジメンコード 014005

レジメン名称 R-CHOP療法（制吐剤アロキシ）

投与間隔 14 日

備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服、PSL（内服） 50mg/m² day 2-6

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）リツシマブ BS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ② ≡生食は1mg/mLとなるように変更する≡ ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～30分 100mL/hr 30～60分 200mL/hr 60～90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014005

レジメン名称 R-CHOP療法（制吐剤アロキシ）

投与間隔 14 日

備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服、PSL（内服） 50mg/m² day 2-6

病日 2 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アロキシ点滴静注バッグ0.75mg [50mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 50 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 750 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	