

レジメンコード 014024

レジメン名称 R-CdM療法（再発Low grade NHLorMCL）

投与間隔 23 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ①	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）リツシマブ BS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ② = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～30分 100mL/hr 30～60分 200mL/hr 60～90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr — 以下余白 —	500 m L 375 m g / m ²	

レジメンコード 014024

レジメン名称 R-CdM療法（再発Low grade NHLorMCL）

投与間隔 23 日

備考

病日 3 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 12 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ロイスタチン注8mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 5 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード014024

レジメン名称 R-CdM療法（再発Low grade NHLorMCL）

投与間隔 23 日

備考

病日 4 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ロイスタチン注8mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 5 m g / m ²	

レジメンコード 014024

レジメン名称 R-CdM療法（再発Low grade NHLorMCL）

投与間隔 23 日

備考

病日 5 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ロイスタチン注8mg [8mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 5 m g / m ²	
— 以下余白 —		