

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ①	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後)リツシマブ BS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ② = 生食は1mg/mLとなるように変更する = ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00~30分 50mL/hr 30~60分 100mL/hr 60~90分 150mL/hr 90~120分 200mL/hr 120~150分 250mL/hr 150~180分 300mL/hr 180~210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00~30分 100mL/hr 30~60分 200mL/hr 60~90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr  — 以下余白 —	500 m L 375 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アロキシ点滴静注バッグ0.75mg [50mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 3 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] アルケラン静注用50mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分  — 以下余白 —	50 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 4 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② ①投与終了後、投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 5 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② ①投与終了後、投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 6 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② ①投与終了後、投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014032

レジメン名称 R-DexaMEAM

投与間隔 28 日

備考 DEX 8m g × 3 day1~10 (内服困難時は注射に変更)

病日 7 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② ①投与終了後、投与開始 点滴時間 3時間	500 m L 75 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		