

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アロキシ点滴静注バッグ0.75mg [50mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ②開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ②開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ 朝：12時間毎 点滴時間 2時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑧ 夕：12時間毎 点滴時間 2時間	500 m L 2000 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」[50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑥ 朝：12時間毎 点滴時間 2時間	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑦ 夕：12時間毎 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g /m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ①開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 014034

レジメン名称 R-IVAC

投与間隔 28 日

備考

病日 6 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) サクシゾン注射用100mg ○化学療法で実施 点滴時間 10分 ①	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) リツシブ BS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ② ≡ 生食は1mg/mLとなるように変更する ≡ ■■ 投与法 (初回投与時) ■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■ 投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～30分 100mL/hr 30～60分 200mL/hr 60～90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	