

レジメンコード 014038BS
 レジメン名称 BR再発 (B ; 90mg/m²、3W)
 投与間隔 21 日
 備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒトコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg 「武田テバ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) リツシマブ BS点滴静注500mg 「KHK」 [50mL/B] ○化学療法で実施 ② ≡ 生食は1mg/mLとなるように変更する ≡ ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90～120分 200mL/hr 120～150分 250mL/hr 150～180分 300mL/hr 180～210分 350mL/hr 210分以降 400mL/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～30分 100mL/hr 30～60分 200mL/hr 60～90分 300mL/hr 90分以降 400mL/hr	500 m L 375 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014038BS
 レジメン名称 BR再発 (B ; 90mg/m²、3W)
 投与間隔 21 日
 備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 90 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 014038BS
レジメン名称 BR再発 (B ; 90mg/m²、3W)
投与間隔 21 日
備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ■■調製後6時間以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L 90 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	