

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 4 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 8 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファラン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 11 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファラン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 22 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファーン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 25 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファラン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 29 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015008

レジメン名称 VMP (1-4サイクル；週2回投与)

投与間隔 42 日

備考 マルファラン 6～9mg/m²、プレドニゾロン 40～60mg/m² day1-4

病日 32 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] ベルケイド注射用3mg 生理食塩液(生食液「小林」) [5mL/A] ベルケイド3mg/Vを生食3mLで溶解 ○化学療法で実施 ①	1.3 m g / m ² 5 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② フラッシュ用 — 以下余白 —	50 m L	