

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管） ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ③ 側管） ②投与開始1時間後に投与開始	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ④ 側管） ③終了後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目、3回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ー 以下余白 ー	500 m L 8 m g /kg	

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管） ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ③ 側管） ②投与開始1時間後に投与開始	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ④ 側管） ③終了後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目、3回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 8 m g / kg	

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 8 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管） ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%） [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ③ 側管） ②投与開始1時間後に投与開始	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ④ 側管） ③終了後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法（初回、2回目、3回目投与時）■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法（4回目以降投与時）■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g / kg	

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 9 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 15 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管） ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%） [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ③ 側管） ②投与開始1時間後に投与開始	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ④ 側管） ③終了後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法（初回、2回目、3回目投与時）■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法（4回目以降投与時）■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g / kg	

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 16 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015038
 レジメン名称 DK d 1コース目
 投与間隔 28 日
 備考 mPSL 20mg day3

病日 22 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間30分	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管） ①と同時に投与開始 ②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服 点滴時間 30分	100 m L 6 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ダラザレックス点滴静注400m g ○化学療法で実施 ④ 側管） ③終了後に投与開始 ◆全量 500mL◆ ■■投与方法(初回、2回目、3回目投与時)■■ 0～1時間 50mL/hr 1～2時間 100mL/hr 2～3時間 150mL/hr 3時間以降 200mL/hr ■■投与方法(4回目以降投与時)■■ 0～1時間 100mL/hr 1～2時間 150mL/hr 2時間以降 200mL/hr — 以下余白 —	500 m L 16 m g /kg	