

レジメンコード 015041  
 レジメン名称 DK d 7コース目以降  
 投与間隔 28 日  
 備考 DEX：40mg day22

病日 1 日目

ページ数：1/6

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <用量>                              | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 5時間                                                                                                                                                                                                                                   | 500 m L                           |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食 [100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管） ①と同時に投与開始<br>②開始と同時に抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤を内服<br>点滴時間 30分                                                                                                                                                            | 100 m L<br>3 瓶                    |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ブドウ糖注（光糖液5%） [50mL/B]<br>カイプロリス点滴静注用40mg<br>○化学療法で実施<br>点滴時間 30分<br>③<br>側管） ②投与開始1時間後に投与開始                                                                                                                                                                                    | 50 m L<br>56 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>ダラザレックス点滴静注400m g<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管） ③終了後に投与開始<br>◆全量 500mL◆<br>■■投与方法（初回、2回目、3回目投与時）■■<br>0～1時間 50mL/hr<br>1～2時間 100mL/hr<br>2～3時間 150mL/hr<br>3時間以降 200mL/hr<br>■■投与方法（4回目以降投与時）■■<br>0～1時間 100mL/hr<br>1～2時間 150mL/hr<br>2時間以降 200mL/hr<br>— 以下余白 — | 500 m L<br>16 m g / kg            |      |

レジメンコード 015041

レジメン名称 DK d 7コース目以降

投与間隔 28 日

備考 DEX：40mg day22

病日 2 日目

ページ数：2/6

| <薬品名・用法>                                                                              | <用量>                              | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>3 瓶                    |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B]<br>カイプロリス点滴静注用40mg<br>○化学療法で実施<br>点滴時間 30分<br>②   | 50 m L<br>56 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分<br><br>— 以下余白 —      | 50 m L                            |      |

レジメンコード 015041

レジメン名称 DK d 7コース目以降

投与間隔 28 日

備考 DEX：40mg day22

病日 8 日目

ページ数：3/6

| <薬品名・用法>                                                                              | <用量>                              | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>3 瓶                    |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B]<br>カイプロリス点滴静注用40mg<br>○化学療法で実施<br>点滴時間 30分<br>②   | 50 m L<br>56 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分<br><br>— 以下余白 —      | 50 m L                            |      |

レジメンコード 015041  
 レジメン名称 DK d 7コース目以降  
 投与間隔 28 日  
 備考 DEX：40mg day22

病日 9 日目

ページ数：4/6

| <薬品名・用法>                                                                              | <用量>                              | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>3 瓶                    |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B]<br>カイプロリス点滴静注用40mg<br>○化学療法で実施<br>点滴時間 30分<br>②   | 50 m L<br>56 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分<br><br>— 以下余白 —      | 50 m L                            |      |

レジメンコード 015041

レジメン名称 DK d 7コース目以降

投与間隔 28 日

備考 DEX：40mg day22

病日 15 日目

ページ数：5/6

| <薬品名・用法>                                                                              | <用量>                              | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>3 瓶                    |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B]<br>カイプロリス点滴静注用40mg<br>○化学療法で実施<br>点滴時間 30分<br>②   | 50 m L<br>56 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分<br><br>— 以下余白 —      | 50 m L                            |      |

レジメンコード 015041

レジメン名称 DK d 7コース目以降

投与間隔 28 日

備考 DEX：40mg day22

病日 16 日目

ページ数：6/6

| <薬品名・用法>                                                                              | <用量>                              | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>3 瓶                    |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B]<br>カイプロリス点滴静注用40mg<br>○化学療法で実施<br>点滴時間 30分<br>②   | 50 m L<br>56 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分<br><br>— 以下余白 —      | 50 m L                            |      |