

レジメンコード 015042

レジメン名称 MM自家移植前処置Me1

投与間隔 4 日

備考 移植3日前、2日前投与 (day-3、day-2) 65-70歳、Ccr<60mL/minは70mg/m²を考慮

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アルケラン静注用50mg 1バイアルを専用溶解液10mLで溶解 ■■調製後90分以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015042

レジメン名称 MM自家移植前処置Me1

投与間隔 4 日

備考 移植3日前、2日前投与 (day-3、day-2) 65-70歳、Ccr<60mL/minは70mg/m²を考慮

病日 2 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] アルケラン静注用50mg 1パイアルを専用溶解液10mLで溶解 ■■調製後90分以内に投与終了■■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	