

レジメンコード 015045

レジメン名称 IsaPd (75歳未満) 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Pom：day1-21、Isa投与前にアセトアミノフェン内服

病日 1 日目

ページ数：1/4

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <用量>                        | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>ポララミン注5mg [1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 15分                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 m L<br>5 瓶<br>1 管<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [250mL/袋]<br>サークリサ点滴静注500mg [25mL/瓶]<br>○化学療法で実施<br>②<br>◆全量 250mL◆<br>注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること<br>▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼<br>■■投与法 (初回投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 225mg/hr<br>90～120分 275mg/hr<br>120～150分 325mg/hr<br>150～180分 375mg/hr<br>180～210分 400mg/hr<br>■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 275mg/hr<br>90～120分 375mg/hr<br>120分以降 400mg/hr | 250 m L<br>10 m g /kg       |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 m L                      |      |

レジメンコード 015045

レジメン名称 IsaPd (75歳未満) 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Pom：day1-21、Isa投与前にアセトアミノフェン内服

病日 8 日目

ページ数：2/4

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <用量>                        | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>ポララミン注5mg [1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 15分                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 m L<br>5 瓶<br>1 管<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注 [250mL/袋]<br>サークリサ点滴静注500mg [25mL/瓶]<br>○化学療法で実施<br>②<br>◆全量 250mL◆<br>注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること<br>▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼<br>■■投与法 (初回投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 225mg/hr<br>90～120分 275mg/hr<br>120～150分 325mg/hr<br>150～180分 375mg/hr<br>180～210分 400mg/hr<br>■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 275mg/hr<br>90～120分 375mg/hr<br>120分以降 400mg/hr | 250 m L<br>10 m g /kg       |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 m L                      |      |

レジメンコード 015045

レジメン名称 IsaPd (75歳未満) 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Pom：day1-21、Isa投与前にアセトアミノフェン内服

病日 15 日目

ページ数：3/4

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <用量>                        | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>ポララミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 15分                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 m L<br>5 瓶<br>1 管<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>サークリサ点滴静注500mg[25mL/瓶]<br>○化学療法で実施<br>②<br>◆全量 250mL◆<br>注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること<br>▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼<br>■■投与法 (初回投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 225mg/hr<br>90～120分 275mg/hr<br>120～150分 325mg/hr<br>150～180分 375mg/hr<br>180～210分 400mg/hr<br>■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 275mg/hr<br>90～120分 375mg/hr<br>120分以降 400mg/hr | 250 m L<br>10 m g /kg       |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 m L                      |      |

レジメンコード 015045

レジメン名称 IsaPd (75歳未満) 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Pom：day1-21、Isa投与前にアセトアミノフェン内服

病日 22 日目

ページ数：4/4

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <用量>                        | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」<br>ポララミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 15分                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 m L<br>5 瓶<br>1 管<br>1 管 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>サークリサ点滴静注500mg[25mL/瓶]<br>○化学療法で実施<br>②<br>◆全量 250mL◆<br>注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること<br>▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼<br>■■投与法 (初回投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 225mg/hr<br>90～120分 275mg/hr<br>120～150分 325mg/hr<br>150～180分 375mg/hr<br>180～210分 400mg/hr<br>■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■<br>00～60分 175mg/hr<br>60～90分 275mg/hr<br>90～120分 375mg/hr<br>120分以降 400mg/hr | 250 m L<br>10 m g /kg       |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 m L                      |      |