

レジメンコード 015049

レジメン名称 DLd-SC 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、レリドミド day1-21、DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (22, 23)

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注 [15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ① 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	

レジメンコード 015049

レジメン名称 DLd-SC 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、レリドミド day1-21、DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (22, 23)

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注 [15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ① 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	

レジメンコード 015049

レジメン名称 DLd-SC 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、レリドミド day1-21、DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (22, 23)

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注 [15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ① 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	

レジメンコード 015049

レジメン名称 DLd-SC 1～2コース目

投与間隔 28 日

備考 皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、レリドミド day1-21、DEX 20mg day1, 2, 8, 9, 15, 16 (22, 23)

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ① 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	