

レジメンコード 015054

レジメン名称 DKd-SC 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤、DEX：40mg day1, 8, 15, (22)

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
皮下注射（S C） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ④ 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 m L	

レジメンコード 015054

レジメン名称 DKd-SC 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤、DEX：40mg day1, 8, 15, (22)

病日 2 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015054

レジメン名称 DKd-SC 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤、DEX：40mg day1, 8, 15, (22)

病日 8 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015054

レジメン名称 DKd-SC 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤、DEX：40mg day1, 8, 15, (22)

病日 9 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015054

レジメン名称 DKd-SC 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤、DEX：40mg day1, 8, 15, (22)

病日 15 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
皮下注射（S C） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ④ 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 m L	

レジメンコード 015054

レジメン名称 DKd-SC 3～6コース目

投与間隔 28 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤、DEX：40mg day1, 8, 15, (22)

病日 16 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		