

レジメンコード 015056

レジメン名称 DBd-SC 1～3コース目

投与間隔 21 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 mg/m ² 5 mL	
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ② 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	

レジメンコード 015056

レジメン名称 DBd-SC 1～3コース目

投与間隔 21 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 4 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015056

レジメン名称 DBd-SC 1～3コース目

投与間隔 21 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 8 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ①	1.3 mg/m ² 5 mL	
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ② 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	

レジメンコード 015056

レジメン名称 DBd-SC 1～3コース目

投与間隔 21 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 11 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015056

レジメン名称 DBd-SC 1～3コース目

投与間隔 21 日

備考 Dara皮下投与前に解熱鎮痛剤/抗ヒ剤内服、DEX 20mg day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 15 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] ダラキューロ配合皮下注[15mL/瓶] ○化学療法で実施 点滴時間 5分 ① 3～5分かけて皮下投与 — 以下余白 —	15 mL	