

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポラミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 2.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg[25mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法（初回投与時）■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 20 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 8 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポラミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 2.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg [25mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 56 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 9 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 15 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポラミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 2.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg[25mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 56 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 16 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射（D I V） ブドウ糖注（光糖液5%）[50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 56 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 015062

レジメン名称 IsaKd 1コース目

投与間隔 28 日

備考 Isa投与前にアセトアミノフェン内服、DEX:20mg day2. 9. 16. 23

病日 22 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポラミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] サークリサ点滴静注500mg [25mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ◆全量 250mL◆ 注意！下記「mg/hr」を「mL/hr」に変換すること ▼▼▼サークリサ点滴速度換算表 参照▼▼▼ ■■投与法 (初回投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 225mg/hr 90～120分 275mg/hr 120～150分 325mg/hr 150～180分 375mg/hr 180～210分 400mg/hr ■■投与法 (2回目以降の投与時) ■■ 00～60分 175mg/hr 60～90分 275mg/hr 90～120分 375mg/hr 120分以降 400mg/hr	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	