

レジメンコード015073
レジメン名称 PCd (CPA 500mg/m²)
投与間隔 28 日
備考 DEX 40mg day1, 8, 15 (75歳以上 DEX 20mg)、POM 4mg day1-21 (75-80歳3mg/日、80歳以上2mg/日から開始)

病日 1 日目 ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード015073
レジメン名称 PCd (CPA 500mg/m²)
投与間隔 28 日
備考 DEX 40mg day1, 8, 15 (75歳以上 DEX 20mg) 、POM 4mg day1-21 (75-80歳3mg/日、80歳以上2mg/日から開始)

病日 15 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	